

## 堆積岩標本セット



泥岩(頁岩)  
mudstone

細かい泥が堆積してできた黒っぽい岩石。薄くはがれやすい泥岩は頁岩(けつがん)と呼ばれる。ジュラ紀の付加体(ふかたい)である美濃帯を構成する堆積岩。岐阜県山県市を流れる神崎川の河床で採集。



砂岩  
sandstone

泥岩よりも粒が大きい砂が集まった堆積岩。泥岩とともにジュラ紀の付加体である美濃帯を構成する堆積岩。岐阜県揖斐川町(いびがわちょう)坂内を流れる坂内川の河床で採集。



礫岩(れきがん)  
conglomerate

小石サイズの石(礫)を多く含む堆積岩。中生代の河川の堆積物が固化したもの。いろいろな色の礫を含むので、成羽五色石(なりわごしきいし)と呼ばれる。岡山県高梁市(たかはし)を流れる成羽川の河床で採集。




礫岩(れきがん)  
conglomerate

灰色の砂質の部分に黒色の小石(礫)が混ざった堆積岩。黒っぽい礫は泥岩。ジュラ紀の付加体である美濃帯の堆積岩。岐阜県揖斐川町坂内を流れる坂内川の河床で採集。板取川や根尾川でも採集できる。



チャート  
chert

細かい石英粒子からなる硬い堆積岩。赤色、褐色、暗緑色、黒色など色には変化がみられる。硬いため丸くなくにくい。岐阜県山県市を流れる神崎川の河床で採集。放散虫(ほうさんちゅう)の化石が含まれることがある。



石灰岩  
limestone

炭酸カルシウムでできた堆積岩。フズリナ、有孔虫などの化石を含むものがある。泥を多く含むものは黒っぽい。ジュラ紀の付加体である美濃帯中に石灰岩体として産する。岐阜県山県市を流れる神崎川の河床で採集。



アンモナイト・三葉虫  
Ammonite & trilobite

アンモナイトは中生代に繁栄した軟体動物の仲間。化石はジュラ紀のペリスフィンクテスの仲間でマダガスカル産。三葉虫は古生代の節足動物。化石はオルドビス紀に繁栄したカリメネの仲間モロッコ産。



凝灰岩(ぎょうかいがん)  
tuff

火山灰が地表や水中に堆積してできた堆積岩。白っぽい色をしているが、風化すると緑色っぽくなる。褐色の部分は粘土鉱物でできている。標本は石材として利用されている茨城県産の大谷石(おおやいし)で、約2000万年前の新生代中新世の火山活動で堆積した。